



AVES DE LA RAZA CUBALAYA

José R. Villa y Elena Trujillo.



La raza de aves Cubalaya es la única reconocida oficialmente, de origen cubano, por la Asociación Nacional de Avicultura, el 9 de no-

viembre de 1935 y fue nombrada así, como homenaje a la República de Cuba, que la patrocinó y refinó.

Se originó a partir de aves Sumatra y de la raza Malaya, vulgarmente conocida por cola de camarón, introducida en Cuba desde las islas Filipinas. Alcanzó gran popularidad y la cría se incrementó debido a su rusticidad, fortaleza, bravura y belleza, combinando las cualidades de producción de carne y huevos.

En 1939 fue aceptada como raza de ave por el Standard of Perfection de la American Poultry Association de los Estados Unidos, para que los criadores supieran a que atenerse al hacer la selección.

Se definieron en este estándar, las características de forma y las variedades fundamentales de color del plumaje en Negra, Roja (India), Blanca y Fantasía, a partir de lo señalado por los criadores de Guanabacoa de aquella época las cuales son:

- Cabeza ancha y corta, con compresión de fuerza, cresta triple, erguida y derecha.
- Pico corto y grueso.

- Ojos pequeños y redondos. Barbillas rojas, muy pequeñas, lisas y no muy finas.
- Orejillas muy pequeñas, no muy lisas y rojas.
- Cola larga, ancha, muy poblada de gallardetes y caudales con tres hileras de plumas, todas largas y brillantes curvadas hacia abajo. La distancia desde el nacimiento de la cola a su extremo, debe ser mayor que desde el pico al nacimiento de la misma, y en conjunto ofrece un aspecto de cola de camarón, de donde vulgarmente toma su nombre.
- Tarsos de color azul pizarra en la variedad negra, o blanco en las variedades roja y blanca.
- Peso estándar (g):

Gallo	2760
Pollón	2070
Gallina	1840
Pollona	1380

La variedad negra se caracteriza por presentar un color negro brillante en su plumaje, con reflejos verdosos en el exterior y gris pizarra en el subcolor. La cresta, cara, barbilla y orejillas son de color rojo brillante sanguíneo, el pico es corto, grueso, fuerte, similar al de la codorniz y de color cuerno muy oscuro. Las patas y dedos son de color azul pizarra oscuro y los ojos pequeños, redondos, hundidos y de color anaranjado claro.

A partir de 1999, el Instituto de Investigaciones Avícolas fue al rescate de esta raza cubana para incluirla en el genofondo del país. Para ello ha establecido un programa de multiplicación en patios particulares, para después realizar los programas de selección y mejora,



en busca de la fijación de los caracteres fenotípicos y productivos destacables en la variedad negra, que actualmente se ha podido recuperar y caracterizar. Se trabaja en la localización de la variedad blanca, la cual ingresó al genofondo en el 2002.

En su generación fundadora, el genofondo avícola, variedad negra, primera generación, logra los indicadores siguientes:

Edad de la madurez sexual: 19 semanas
Edad del pico de puesta: 45 semanas
Porcentaje de puesta en el pico: 52,2 %
Huevos /ave hasta las 70 semanas

de edad: 76,4

Peso de los huevos a las 78 semanas

de edad: 47,5 g

Peso vivo de los gallos: 2 300 g

Peso vivo de las gallinas: 1467 g

El comportamiento del peso vivo de las aves Cubalaya, variedad negra, en su primera generación, se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Peso vivo en la etapa de crecimiento

Edad (semanas)	Peso vivo (g)	Ganancia de peso (g/día)
Al nacer	30.5	-
1	62.7	32.2
2	105.8	43.1
3	139.2	33.4
4	196.8	57.6
5	252.2	55.4
6	306.6	109.8
7	401.2	95.2
8	503.6	102.4
9	601.8	98.2
10	712.0	110.2

Estos resultados evidencian que el peso vivo de estas aves es bajo y debe constituir un indicador a mejorar en las próximas generaciones. Algo similar se observa en el peso de los

huevos (Tabla 2), el cual debe incrementarse por la vía de la selección genética.

Tabla 2. Peso de los huevos de las aves Cubalaya

Edad (semana)	Peso (g)
22	28.58
28	30.16
32	33.24
36	35.12
40	37.61
44	42.19
48	47.33
52	48.29

El comportamiento de las características productivas de las gallinas de esta raza se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Características productivas. Generación I.

Edad de la madurez sexual (semanas)	22
Edad del pico de la puesta (semanas)	47
Porcentaje de puesta en el pico (%)	60 %
Huevos por ave alojada hasta las 70 semanas de edad	80
Peso vivo adulto (g)	
- Machos	2420
- Hembras	1605

Para la selección y mejora de la Cubalaya en su variedad negra, las características fenotípicas consideradas en esta primera etapa de recuperación, dada la amplia variabilidad genética, fueron: la coloración del plumaje, cola de camarón, forma de la cresta y el color de los tarsos, barbillas y orejillas. Una vez rescatada estas peculiaridades, nos ocuparemos de los caracteres productivos y reproductivos de esta raza. ♀